

Si tiene preguntas,
comuníquese con su
Gerente de Cuidados
de Enfermería al
1.800.832.0778.



¡Estamos aquí para
ayudarlo!



**POSITIVE
HEALTHCARE™**

Línea de Atención al
Cliente las 24 horas:
1.800.832.0778



**POSITIVE
HEALTHCARE™**

SÍFILIS

LAS ETAPAS DE LA SÍFILIS:

PRIMERA ETAPA – Aparecerá una lesión abierta indolora, conocida como chancro. Dura entre 3 y 6 semanas, y aparece en la zona genital. Estas lesiones pueden pasar desapercibidas y se diseminan con facilidad.

SEGUNDA ETAPA – Comienza de 3 a 6 semanas después de la aparición de la primera lesión. Puede aparecer una erupción, que dura entre 2 y 6 semanas, en las palmas y/o las plantas de los pies. También pueden presentarse los siguientes síntomas: fiebre leve, fatiga, dolor de garganta, pérdida de cabello, pérdida de peso y glándulas inflamadas.

ETAPA LATENTE (TERCERA) – Se presenta entre la primera y la segunda etapas. No hay síntomas. Puede durar entre uno y 46 años.

ETAPA TARDÍA (CUARTA) – Si no se trata, pueden producir daños graves en el sistema nervioso, el corazón y el cerebro, e incluso puede causar la muerte.

La Gran Imitadora

Puede ser difícil darse cuenta que tiene sífilis, ya que los síntomas son similares a los de muchas otras enfermedades comunes. La sífilis se ha conocido como “la gran imitadora”.

Puede averiguar si tiene sífilis mediante un análisis de sangre, especialmente si no tiene ninguna lesión. Si tiene una lesión, llame a su proveedor de cuidados de la salud para que le realice el análisis.

Cómo se transmite la sífilis

La sífilis puede transmitirse a través de cualquier tipo de acto sexual y al besar. Es muy contagiosa si tiene lesiones abiertas o erupción en la piel.

El primer paso en el diagnóstico es hablar con su proveedor de cuidados de la salud sobre sus actividades sexuales y sus síntomas.



EL RIESGO DE CONTRAER SÍFILIS AUMENTA SI USTED:

- Tiene relaciones sexuales sin protección.
- Tiene relaciones sexuales con distintas personas.
- Tiene relaciones sexuales con una persona que tiene sífilis.
- Tiene relaciones sexuales con personas que tienen distintas parejas sexuales.
- Tiene relaciones sexuales con personas que practican sexo por dinero o drogas.
- Tiene VIH.

Tratamiento

Debe tomar antibióticos para tratar la sífilis. Son efectivos en cualquier etapa de la enfermedad. El tratamiento con antibióticos no puede revertir el daño causado por la etapa tardía de la enfermedad. Sin embargo, puede evitar que se desarrollen más problemas.

Consulte a su proveedor de cuidados de la salud si cree que estuvo expuesto a la sífilis o contrajo esta enfermedad.

